

IGIENE E OGGETTI PERSONALI

- Lavare a 55–60°C per almeno 20 minuti: lenzuola, asciugamani, pigiama, indumenti.
- Gli oggetti non lavabili vanno: lavati a secco, oppure chiusi in sacchi di plastica per 15/20 giorni.
- Immergere pettini e spazzole in acqua bollente per almeno 15 minuti.
- No disinfestazioni ambientali: basta una pulizia quotidiana con aspirapolvere.
- Non usare shampoo antiparassitari a scopo preventivo.

PREVENIRE E' MEGLIO CHE GRATTARSI!!!



OCCHIO
AL
PIDOCCHIO



IN CASO DI PERSISTENZA NELLA COMUNITA'
SCOLASTICA IL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE SI RENDE DISPONIBILE
PREVIO ACCORDO, PER UN INCONTRO
INFORMATIVO CON IL PERSONALE
SCOLASTICO E LE FAMIGLIE

RIFERIMENTI UTILI:

- Vaccinazioni.pordenone@asfo.sanita.fvg.it
 - Vaccinazioni.azzano@asfo.sanita.fvg.it
- Vaccinazioni.sanvito@asfo.sanita.fvg.it
 - Vaccinazioni.sacile@asfo.sanita.fvg.it
- Vaccinazioni.maniago@asfo.sanita.fvg.it
 - Vaccinazioni.spilimbergo@asfo.sanita.fvg.it

COS'È LA PEDICULOSI?

La pediculosi è un'infestazione del cuoio capelluto causata da un parassita umano: il *Pediculus capitis*. I pidocchi sono parassiti lunghi 2-3 mm, si nutrono di sangue e provocano prurito, ma non trasmettono malattie. Le uova (lendini) sono ovali, perlacee e molto aderenti alla base del capello: non si staccano con lo scuotimento, a differenza della forfora. In 7-10 giorni si schiudono, e in altri 10 giorni i pidocchi diventano adulti pronti a deporre nuove uova. Lontano dal cuoio capelluto:

- i pidocchi muoiono entro 24-48 ore;
- le uova non sopravvivono al freddo.

COME AVVIENE IL CONTAGIO?

Il contagio avviene quasi esclusivamente per contatto diretto testa-testa e colpisce frequentemente i soggetti che vivono nella stessa famiglia o che frequentano le stesse collettività. Più raramente la trasmissione può avvenire attraverso lo scambio di pettini, spazzole, fermagli per capelli, cappelli, sciarpe ecc.



COME SI RICONOSCE

Per la diagnosi occorre effettuare una scrupolosa osservazione dei capelli e del cuoio capelluto allo scopo di individuare la presenza di pidocchi e/o di lendini (in particolare la nuca, le tempie e dietro le orecchie). L'ispezione va effettuata in condizioni di buona illuminazione ed eventualmente con l'aiuto di una lente di ingrandimento. In caso di pediculosi l'ispezione va estesa a tutti i componenti del nucleo familiare.



COME SI TRATTA?



- 1 Utilizzare prodotti a base di insetticidi : PIRETRINA VEGETALE, PERMETRINE, MALATHION.
- 2 Se si utilizza **PIRETRINA** lasciare agire il prodotto per un tempo superiore rispetto a quello indicato sulla confezione.
- 3 Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni con lo stesso prodotto.
- 4 Rimuovere le lendini con pettine a denti fitti (0,3 mm) e manualmente, dopo ogni trattamento.



**Evitare trattamenti
PREVENTIVI in quanto
INEFFICACI!!!!**