



INFORMATIVA DI PREMEDICAZIONE IN PREVISIONE DI ESAMI RADIOLOGICI CON MEZZO DI CONTRASTO IN CASO DI ALLERGIA

La premedicazione deve essere eseguita dai Pazienti che devono sottoporsi ad esami radiologici che prevedano l'iniezione del mezzo di contrasto per via endovenosa con:

- *PREGRESSA REAZIONE ALLERGICA O SIMIL-ALLERGICA A SEGUITO DI UNA PRECEDENTE INDAGINE CON LA MEDESIMA CLASSE DI MEZZO DI CONTRASTO,*
- *ASMA BRONCHIALE O ORTICARIA-ANGIOEDEMA NON CONTROLLATO DALLA TERAPIA,*
- *MASTOCITOSI O LIVELLI ELEVATI DI TRIPTASI,*
- *PREGRESSA E DIMOSTRATA ANAFILASSI IDIOPATICA.*

Premedicazione in Pazienti con anamnesi positiva per reazione avversa a mezzo di contrasto noto:

- **12 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa,
- **2 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa.

Premedicazione in Pazienti con anamnesi positiva per reazione avversa a mezzo di contrasto non noto:

- **13 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa,
- **7 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa,
- **1 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa.

Premedicazione in Pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi e anafilassi idiopatica:

- **12 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa
- **2 h prima** dell'esame: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg) + cetirizina da 10 mg per via orale oppure metilprednisolone 40 mg + clorfenamina 10 mg per via intramuscolare o endovenosa

La premedicazione dev'essere effettuata previo consenso del MMG o dello Specialista a conoscenza della situazione clinica del Paziente.

L'esame radiologico di cui si tratta non verrà eseguito qualora il Paziente non risultasse premedicato secondo le prescrizioni sopra specifiche.

Dichiaro di aver predisposto la premedicazione:

Data:

Timbro e firma del Medico Curante o dello Specialista
